

Ammarnästraktens fåglar

Sören Svensson

Anders Enemar började sina fågelstudier i Ammarnäs i juni 1950. Det året arrangerade Sveriges Ornitologiska Förening den ornitologiska världskongressen. En av exkursionerna gick till Ammarnäs, och Anders var engagerad som rekognosör och biträdande exkursionsledare under Gustaf Rudebecks regim. Exkursionens höjdpunkt, i både ornitologisk och fysisk bemärkelse, blev en ringtrast på Ribovardos topp. Redan då var således Ammarnäs ett välkänt fågelområde. P. O. Swanberg hade genom sin bok *Fjällfåglars paradis* gjort Svaipaområdet alldeles norr om Ammarnäs välkänt. Bengt Berg hade varit i Ammarnäs och med den store björnjägaren Grundströms och andra städslade ortsborns hjälp dragit linor över fjällheden för att skrämma upp fåglarna från bona, i syfte att komplettera sin rika äggsamling.

Ett drygt decennium senare fick Anders tillfälle att återknyta bekantskapen med fågelmarkerna i Ammarnäs. Tack vare det arbete, som under Anders' ledning utvecklades inom Luvre-projektets ram från år 1963, är numera Ammarnästraktens fågelfauna en av de bäst kända fågelfaunorna i vår fjällvärld över huvud taget.

Förteckningen ger en allmän bild över alla fågelarters förekomst runt Ammarnäs. Området omfattar större delen av det topografiska kartbladet 25G. Här ingår östra delen av Ammarfjället, Vindelälvens dalgång från Jillesnåle till Vitnjul, Tjulån och Tjulträskan, fjällen söder om Kraddsele, Djupfors och Ammarnäs, bl.a. Valle, Nase, Svare, Guvertefjällen, Äivesåive, Stor-Aigert och Vuometjåkke samt norr om Ammarnäs det vidsträckta Björkfjället till Dellikälven och Räker. Kunskapen om de allmänna arternas tätheter i olika miljöer kommer främst från kvantitativa inventeringar. De mindre vanliga arternas förekomst har blivit känd genom talrika exkursioner i området.

Smålom. Häckar på ett fåtal platser i området, främst ovan trädgränsen. Men smålomar ses och hörs dagligen tack vare sina flygturer mellan boplatserna och fiskesjöarna, då de ljudligt kacklande kommer på hög höjd. Tjulträsk och Gautträsk är omtyckta fiskesjöar och där vistas lommarna också på våren innan fjällsjöarna blivit isfria.

Storlom. Häckar i flera sjöar i området, även ovan trädgränsen. Förekomsten begränsas av att storlommen kräver öar att häcka på, och sådana saknas i många sjöar. På våren före islossningen i fjällsjöarna uppträder större

antal i de lägre belägna sjöarna, särskilt Gautsträsk. Ses regelbundet i deltat nära byn.

Islom. Observerad en gång. En adult fågel i sommardräkt sågs i Tjulträsk den 26 juli och 3 augusti 1989.

Gråhakedopping. Sporadisk gäst.

Svarthakedopping. Häckning eller häckningsförsök nästan årligen med något enstaka par.

Storskarv. Sporadiskt överflygande, troligen mellan Bottenhavet och Norska havet.

Rördrom. Sporadisk gäst.

Häger. Sällsynt, sannolikt ej årlig besökare under våren och sensommaren.

Vit stork. Sporadisk gäst.

Knölsvan. Sporadisk gäst.

Sångsvan. Besöker området regelbundet, särskilt under våren och sommaren. Sträckande flockar ses passera över området både vår och höst.

Sädgås. Iakttas under vår- och höststräcket, men häckar veterligen inte i området. Sträckande flockar kan förväxlas med följande art

Spetsbergsgås. En del av de gäss som sträcker över området kan vara av denna art. Enstaka individer har rastat i deltat, t.ex. i juni 1994 och 1996.

Fjällgås. Förr häckfågel i trakten, sedan flera decennier utrotad. Har minskat kraftigt i hela Skandinavien. Numera observeras endast några få individer (2-4 individer 1989-1996), vanligen i slutet av maj då de betar gräs i deltat. Flera av dessa fåglar har varit ringmärkta, vilket visar att de delvis kommer från de utplanteringar som görs för att rädda denna hotade art. Vid enstaka tillfällen har större flockar observerats även under senare år, t.ex. 12 individer 1996.

Grågås. Sällsynt gäst.

Stripgås. Har tillfälligt besökt Ammarnäs. Ett par uppehöll sig nära byn 15-17 juni 1993. Det kan röra sig om förrymda eller förvildade parkfåglar.

Kanadagås. Sällsynt gäst.

Gravand. Sporadisk gäst.

Bläsand. Allmän häckfågel. Finns såväl vid större sjöar som vid småtjärnar, på alla nivåer upp till fjällhedens lägre delar. Större ansamlingar av hanar, vanligen runt ett femtiotal, kan ses i deltat under vår och höst.

Snatterand. Denna arts expansion i Norrland, liksom i resten av Sverige, har under senare tid satt spår även i Ammarnäs. En honfärgad fågel sågs i Tjulträsk den 24 juli 1995.

Ricka. Allmän häckfågel vid sjöar och vattendrag av alla storlekar, särskilt i

- skogsregionen men även på kalfjället i videregionen. Häckar även i tät skog, dock i närheten av en tjärn, översvämning eller bäck.
- Gräsand.** Häckar främst i relativt vegetationsrika sjöar, bl.a. deltat i Ammarnäs, med enstaka par upp i videregionen.
- Stjärtand.** Sällsynt häckfågel.
- Årta.** Häckar, men troligen inte årligen, med enstaka par i deltat. Ungkullar har iakttagits.
- Skedand.** Ej känd som häckfågel, men par eller hannar ses nästan årligen.
- Brunand.** Sporadisk gäst.
- Vigg.** Spridd men sparsamt förekommande art. Uppträder i enstaka fjällsjöar men däremot mera frekvent i deltat, där upp till trettio fåglar kan ses sommartid. Ställer högre krav på vegetation och rikare miljö än berganden.
- Bergand.** Häckar främst i sjöar ovan trädgränsen. I ett 12 kvkm stort område runt Raurejare fanns 3-7 par åren 1983-1991. Har troligen minskat eftersom bara ett par noterades åren 1993 och 1995. Uppträder vår och höst i de lägre belägna sjöarna. Ses regelbundet i deltat och Tjulträsk under våren och sensommaren. Upp till 40 fåglar har setts i Lilla Tjulträsk.
- Alfågel.** Häckar främst i sjöarna ovan trädgränsen, där den är förhållandevis väl spridd, men i små antal.
- Sjöorre.** Häckar främst i sjöarna ovan trädgränsen, men även på lägre nivåer. Flera bofynd har gjorts vid Tjulträsk. Är vanligare än svärtan, bl.a. på sensommaren i Tjulträsk. I ett 12 kvkm stort sjöområde kring Raurejare har ca 10 par häckat årligen.
- Svärta.** Vida spridd men fåtalig häckfågel i fjällsjöarna. Före islossningen kan större flockar ligga och vänta i Gautträsk. Kring Raurejare har i genomsnitt 3 par registrerats per år.
- Knipa.** Häckfågel främst i skogslandets sjöar. Ses även i sjöar ovan trädgränsen, där den dock inte kan häcka på grund av boplatsbrist. Häckar gärna i holkar runt byn.
- Salskrake.** Antalet observationer har ökat under senare år. Ses främst i deltaområdet, där den häckar, troligen med flera par. Senast 1996 iaktogs en hona med åtta dunungar.
- Småskrake.** Sällsynt häckfågel bl.a. runt Gautträsk. Finns också på lämpliga ställen längs själva Vindelälven.
- Storskrake.** Sparsam häckfågel i trädhåll och holkar vid sjöar och längs älven. Iaktas även ovan trädgränsen och kan möjligen häcka även där.
- Bivråk.** Sällsynt gäst, säkerligen inte häckfågel.
- Havsörn.** Både gamla och unga fåglar ses flera gånger årligen, bl.a. då de

- besöker renslakterierna. En del av dessa kommer troligen från Norge.
- Brun kärrhök.** Observerad en gång, den 7 juli 1996.
- Blå kärrhök.** Sällsynt till sparsam häckfågel från myrarna i skogsregionen till videregionen på fjällheden. Antalet par varierar kraftigt med gnagartillgången. Enstaka, särskilt gnagarfattiga år kan arten möjligen saknas som häckfågel.
- Stäpphök.** Observerad en gång, en adult hane den 12 juni 1996.
- Duvhök.** Sparsam häckfågel upp till gränsen mellan barr- och björkskogen, men har troligen även häckat i björkregionen.
- Sparrhök.** Sparsam häckfågel upp till gränsen mellan barr- och björkskogen. Torde oftare än duvhöken häcka även i björkskogen.
- Ormvråk.** Troligen ej häckfågel. Endast enstaka observationer, dock nästan årligen, föreligger.
- Fjällvråk.** Häckar i starkt varierande antal. Under år med riklig förekomst av smågnagare är arten allmän, och häckar då såväl i träd i skogarna som i stup eller på platta marken på fjällhedarna. Riktigt gnagarfattiga år kan arten nästan helt saknas, i varje fall som häckfågel.
- Kungsörn.** Ett fåtal par häckar i området. Även yngre, icke häckande fåglar ses regelbundet.
- Fiskjuse.** Observeras årligen. Häckade tidigare med något par i området.
- Tornfalk.** Häckar möjligen årligen med något enstaka par. Vissa år med god gnagarförekomst är arten en ganska allmän häckfågel på både fjällheden och myrar och hyggen i skogslandet. Den har häckat kolonivis i Aitenasbranten åtminstone ett år.
- Aftonfalk.** Sporadisk gäst.
- Stenfalk.** Tämligen allmän häckfågel, särskilt i björkskogen. Häckar vanligen i gamla kråkböns och gärna i anslutning till kolonier av björktrast.
- Lärkfalk.** Indikationer på häckning saknas; endast entaka observationer i mitten av juni föreligger.
- Jaktfalk.** Ett fåtal par häckar i området. Ses vanligen i samband med sina långa jakturer.
- Pilgrimsfalk.** Torde ej häcka i området, men har iakttagits tillfälligt.
- Järpe.** Mindre allmän i äldre, tätare och fuktigare barrskog, gärna där det finns gläntor med lövinslag. Går även upp i björkregionen med enstaka par. Har däremot blivit sällsyntare i den odlade skogen utanför reservatet.
- Dalripa.** Allmän, men i växlande antal. Förekommer särskilt i björk- och videregionen men även i barrskogen. Förflyttningar i höjdled görs under olika årstider beroende på födotillgång och snöförhållanden.
- Fjällripa.** Tämligen allmän och vida spridd på högre nivåer, gärna i blockrik

- terräng. Dalripa och fjällripa möts under häckningstiden på nivåerna straxt under tusen meter.
- Orre.** Var vanligare förr, då den spelade på Tjulträskis is och på en liten myr i närheten. Numera finns endast ett fåtal fåglar spridda på slutningarna, främst i björkskogen.
- Tjäder.** Tämligen allmän i de kvarvarande äldre barrskogsbestånden, men går sparsamt upp i björkregionen. Jämfört med orren har tjädern en god stam i trakten.
- Fasan.** Har observerats vid något enstaka tillfälle.
- Vattenrall.** Sporadisk gäst.
- Kornknarr.** Sporadisk gäst.
- Rörhöna.** Sporadisk gäst.
- Sothöna.** Sällsynt gäst.
- Trana.** Sällsynt, sannolikt ej årlig häckfågel. Ses under flyttningen så gott som årligen.
- Strandskata.** Sällsynt gäst, vanligen enstaka fåglar, någon gång en mindre flock, som rastar i deltat.
- Tjockfot.** Har iakttagits i deltat vid ett tillfälle.
- Större strandpipare.** Mindre allmän häckfågel på fjällhedarna främst ovan videregionen, gärna nära sjöar.
- Fjällpipare.** Tämligen allmän till sparsam häckfågel på fjällhedarna ovan videregionen, sällsynt även i videregionen. Föredrar den typ av rundade lågfjäll med vidsträckta torra hedar som finns på exempelvis Björkfjället.
- Ljungpipare.** Allmän häckfågel på alla nivåer ovan skogsgränsen. Normala tätheter ligger på ca tre par per kvadratkilometer.
- Tofsvipa.** Observeras regelbundet på våren, undantagsvis upp till tusen meters nivå. Har under många år häckat vid Bjergens renslakteri vid trädgränsen och tillfälligt på myr nära Djupfors. Däremot är det inte känt om den häckat i deltat.
- Sandlöpare.** Sporadisk gäst.
- Småsnäppa.** Det första svenska häckfyndet gjordes vid Libojaure på Ammarfjället 1965.
- Mosnäppa.** Fanns tidigare som häckfågel i deltat, men veterligen ej de senaste åren. Häckar däremot med åtskilliga par vid sjöar på fjällheden, ibland flera par ganska tätt, eller med enstaka par utspridda på våta och vidrika myrmarker på fjället.
- Skärnsnäppa.** Vida spridd men tämligen sällsynt häckfågel på högre nivåer, vanligen ovan 1000 meter och gärna i närheten av sjöar och tjärnar.
- Kärrensäppa.** Häckar på myrar och torrare hedar ovan trädgränsen. Normala

- tätheter i goda biotoper är 3-4 par per kvkm.
- Myrsnäppa.** Sällsynt gäst under sträcktid.
- Brushane.** Tämligen allmän häckfågel på myrmarker i både vide- och skogsregionen.
- Dvärgbeckasin.** Sällsynt häckfågel i de östra delarna.
- Enkelbeckasin.** Allmän häckfågel på myrar på alla nivåer till och med vide-regionen. I björkregionen häckar den även i fuktig skog. På fjällhed med myrar är tätheten ca 4 par/kvkm.
- Dubbelbeckasin.** Sällsynt häckfågel på myrar i björk- och videregionen. Bo har påträffats så långt ner som vid Tjulträskets strand. Har sannolikt minskat. Bara ett fåtal spelplatser kända och åtminstone en mångårig spelplats har försvunnit helt.
- Morkulla.** Tämligen allmän häckfågel i både björk- och barrskogen.
- Myrspov.** Sällsynt häckfågel. Den har även setts rastande eller på sträck i deltat.
- Småspov.** Sällsynt häckfågel på vissa fjällhedar i den övre delen av vide-regionen. Tillfällig gäst i deltat.
- Storspov.** Sällsynt besökare. Vid några tillfällen har den hörts spela över deltat i maj och juni.
- Svartsnäppa.** Sällsynt rastare under sträcket. Har häckat vid åtminstone ett tillfälle på en fjällmyr.
- Rödbena.** Tämligen allmän häckfågel, särskilt ovan trädgränsen i videregionen och gärna i anslutning till sjöar.
- Gluttsnäppa.** Tämligen allmän häckfågel i såväl björk- som barrskogsregionen. Enstaka par häckar även på fjället nära björkskogsgränsen.
- Skogssnäppa.** Möjligen häckfågel eftersom spelande fåglar noterats vid några tillfällen i slutet av maj. I övrigt sällsynt sträckgäst.
- Grönben.** Allmän häckfågel på myrar från barrskogen upp i videregionen.
- Drillsnäppa.** Tämligen allmän häckfågel upp till skogsgränsen, därovan sällsynt, i anslutning till sjöar och vattendrag, även mindre sådana i skog.
- Roskarl.** Sporadisk gäst.
- Wilsonsimsnäppa.** Iakttagen en gång i deltat.
- Smalnäbbad sirmsnäppa.** Tämligen allmän häckfågel i björk- och vide-regionen. Under våren kan man se upp till ett par hundra individer i deltat, där de väntar på att fjällen skall bli snöfria. Stora flockar kan även ses i Lilla Tjulträsk.
- Brednäbbad sirmsnäppa.** En vår iakttagen i deltat och dammen i byn.
- Fjällabb.** Allmän på fjällhedarna. Vissa år med gnagarbrist kan labbarna lämna området tidigt utan att häcka. År med rik förekomst av sorkar och lämlar

häckar fjälllabben med upp till ca 1 par per kvkm. År utan häckning samlas labbarna i stora flockar före återresan till havet; upp till 175 individer har setts i flock.

Dvärgmå. Sporadisk gäst under senare år, säkert en följd av den allmänna populationsökningen i Norrland.

Skrattmå. Besöker deltat årligen, särskilt under våren, men har inte häckat i området. Enstaka individer har observerats även på andra ställen, t.ex. i Tjulträsk.

Fiskmå. Vida spridd men fåtalig häckfågel i sjöar av alla slag och på alla nivåer. Några par häckar i Marsivagge.

Silltrut. Sällsynt översträckare som tillfälligt kan rasta i området.

Gråtrut. Sällsynt till sparsam gäst, främst i deltat men observerad även i Tjulträsk.

Tretåig må. Sporadisk gäst.

Fisktärna. Häckning har konstaterats i deltat och arten har förmodligen funnits med något par årligen åtminstone det senaste decenniet.

Silvertärna. Häckar årligen på flera platser såväl i deltat som i fjällsjöar, även ovan tusen meters höjd, t.ex. i Libojaure. Häckar både med enstaka par och i mindre kolonier.

Svarttärna. Sporadisk gäst. En höst observerades flera individer i deltat.

Alkekung. Sporadisk gäst.

Stäpphöna. Sporadisk gäst.

Tamduva. Sporadisk gäst. Ofta rör det sig nog om brevdovor.

Skogsduva. Sporadisk gäst.

Ringduva. Sparsam men årlig häckfågel i barrskogsregionen upp till gränsen mot björkskogen. Den ses även i björkregionen och kan möjligen undantagsvis häcka även där.

Turkduva. Tillfälligt iakttagen i Ammarnäs by.

Gök. Allmän häckfågel på alla nivåer till och med videregionen. Synes ha minskat under senare år i likhet med vad som skett i resten av landet.

Berguv. Lär förr ha funnits på Näsberget. Inga indikationer på häckning i området numera.

Fjälluggla. Mycket sällsynt häckfågel. Häckar endast under år med osedvanligt gott om lämlar. Nästan årligen observeras dock enstaka individer.

Hökuggla. Observeras i området årligen och häckar nästan årligen. Åtskilliga kullar kan påträffas under år med riklig gnagartillgång.

Sparvuggla. Enstaka observationer under alla årstider. Sannolikt häckfågel i barrskogen.

Slaguggla. Enstaka par häckar i områdes östra delar.

- Lappuggla.** Sällsynt och knappast årlig häckfågel. Finns främst i barrskog nedströms Ammarnäs. Har häckat på Näsberget och även längre upp längs älven.
- Hornuggla.** Noteras som häckfågel endast under särskilt goda gnagarår, då dock flera hanar hörts ropa på senvintern och flera kullar registrerats i juni.
- Jorduggla.** Tämmligen allmän häckfågel under goda gnagarår på myrar både i skogsregionerna och på fjället. Under mellanåren är arten sällsynt men årlig åtminstone som besökare.
- Pärluggla.** Sällsynt häckfågel i starkt varierande antal, främst i barrskogen. Gnagarrika år kan flera exemplar höras från byn.
- Nattskärra.** Sporadisk gäst.
- Tornseglare.** Häckar säkerligen ej, men ses nästan årligen, dock i ringa antal.
- Göktyta.** Numera sällsynt häckfågel, främst i björkskogsregionen.
- Gråspett.** Mycket sällsynt häckfågel. Ses främst vintertid, men har iakttagits vid några tillfällen även sommartid, bl.a. på Näsberget.
- Gröngöling.** Sporadisk gäst.
- Spillkråka.** Sällsynt i barrskogsregionen.
- Större hackspett.** Ses då och då. Inga tecken på att artens kulle häcka i trakten.
- Mindre hackspett.** Sällsynt men regelbunden häckfågel i björkskogen. Ringmärkningsfångst på sensommaren tyder möjligen på att denna art minskat i fjällbjörkskogarna på samma sätt som en gjort i södra Sverige medan registreringarna under häckningstid tyder på ett konstant bestånd med några få par.
- Tretåig hackspett.** Sparsam och regelbunden häckfågel i både barr- och björkskogen. Tätheten torde vara av storleksordningen ett par per tio kvadratkilometer.
- Sånglärka.** Enstaka individer sjunger vissa år i deltat. Har några år hållit revir även på fjällhed och kan möjligen även ha häckat där.
- Berglärka.** Fanns under sextioalet sparsamt på de flesta fjäll runt Ammarnäs, inklusive Kaisatts och Valle, och fjällen söder om Djupfors. Minskade under sjuttioalet och försvann från de flesta fjäll utom Björkfjället, där den fortfarande häckar i fortsatt minskande antal.
- Backsvala.** Förekomsten beror helt på tillgång på häckningsplatser. Enstaka par häckar i deltats naturliga erosionskanter, men de stora vattenståndsvariationerna gör att framgången är låg. Har tidigare funnits i erosionsbrant vid Tjulträsk. Finns i ett grustag mellan Ammarnäs och Tjulträsk (upp till 100 par) samt i smärre täkter längs Vindelälven. Finns sedan en del år tillbaka i grustag vid Djupfors.

- Ladusvala.** Häckar regelbundet med flera par vid bebyggelse.
- Hussvala.** Häckar regelbundet med flera par vid bebyggelse. Häckar så långt västerut som vid Rödingvik. Naturliga klipphäckningar är inte kända från området, men borde rimligtvis kunna förekomma.
- Trädpiplärka.** Tämlichen allmän häckfågel i både barr- och björkskogen upp till trädgränsen. Har minskat starkt i antal under senare år. Normal täthet ligger mellan 5 och 10 par/kvkm.
- Ängsbiplärka.** Mycket allmän häckfågel på främst fjällhedarna och myrar i skogslandet. Häckar även i gles björkskog. På fjällhedarna kan tätheten överstiga 30 par per kvadratkilometer.
- Rödstrupig piplärka.** Häckar på fjällhed enstaka år, främst då våren varit sen och kall.
- Gulärta.** Tämlichen allmän häckfågel på myrar, hyggen, slätterängar och älvstränder, sällsynt även i nedre videregionen. Häckar även i gles björkskog.
- Forsärta.** Enstaka par häckar i området, dock är det inte säkert att det sker årligen.
- Sädesärta.** Tämlichen allmän häckfågel i anslutning till bebyggelse och längs sjöstränder och bäckar upp till trädgränsen.
- Sidensvans.** Iakttas sällsynt, även under sommaren. Den har dock aldrig registrerats häckande.
- Strömstare.** Tämlichen allmän häckfågel längs de flesta vattendrag i skogsregionen, även mindre sådana. Går normalt inte ovan trädgränsen.
- Gärdsmyg.** Sällsynt och möjligen årlig häckfågel i såväl barr- som björkskogen.
- Järnsparv.** Allmän häckfågel i både barr- och björkskogen upp till trädgränsen. Tätheten varierar mellan 20 och 40 par per kvkm i björkskogen medan den i barrskogen sällan överstiger 10 par/kvkm.
- Rödhake.** Glest förekommande men årlig häckfågel i barrskogen, sällsynt och ej årligen i björkskogen. I barrskogen kan tätheten goda år nå upp till över 10 par/kvkm, men är oftast betydligt lägre.
- Blåhake.** Allmän häckfågel i björkskogen och videregionen. Normal täthet är mellan 10 och 20 par/kvkm i björkskog. På fjällheden är den sällsyntare men kan i god biotop och goda år finnas med nästan 10 par/kvkm.
- Rödstjärt.** Allmän häckfågel i alla skogar. Varierar från under 10 till ca 20 par/kvkm i rikare björkskog, glesare i barrskog. Med hjälp av holkar kan tätheten i barrskog nå upp till samma nivå som den utan holkar i björkskog.
- Buskskvätta.** Mindre allmän häckfågel på myrar och slätterängar samt längs vägar. Sällsynt i gles björkskog och längs trädgränsen. Har minskat kraftigt under senare decennier.

- Stenskvätta.** Häckfågel i lämplig terräng på alla nivåer, men särskilt på fjällhedarna där den når över tusenetersnivån. Normala tätheter på fjällheden ligger kring fyra par per kvkm.
- Ringtrast.** Sparsam häckfågel från den övre björkskogen genom videregionen, gärna i anslutning till blockrik terräng eller stup och rasbranter. Förekomsten är dock fläckvis och arten saknas inom stora delområden.
- Koltrast.** Sällsynt, troligen årlig häckfågel upp till björkskogen och vid bebyggelsen.
- Björktrast.** Allmän häckfågel, särskilt i björkregionen, men förekommer upp genom videregionen till tusenetersnivån. På fjällheden läggs boet på marken. Tätheterna i björkskog varierar lokalt kraftigt mellan olika år beroende på kolonibildningar. Den har i rik ängsbjörkskog varierat mellan 5 och nästan 50 par/kvkm i inventerade provytor. På högre nivåer i hedartad björkskog är arten väsentligt sällsyntare.
- Taltrast.** Tämmligen allmän till allmän häckfågel i skog på alla nivåer. Finns normalt ej ovan trädgränsen. I rik björkskog och barrskog ligger tätheten runt 10 par/kvkm .
- Rödvingetrast.** Allmän häckfågel på alla nivåer. Häckar tämmligen allmänt även i videregionen. Variationerna mellan åren är stora på grund av viss gles kolonibildning. Från under 10 till över 50 par/kvkm har registrerats i provytorna. I barrskogen är tätheten däremot sällan över 5 par/kvkm.
- Dubbeltrast.** Häckar mindre allmänt i barrskogsregionen, gärna i anslutning till hyggen.
- Sävsångare.** Förekommer sparsamt och fläckvis i högvuxna viddefält längs sjöar och älvar.
- Busksångare.** Sporadisk gäst. Registrerad en gång: en hane sjöng vid Tjulträsk by 17-18 juni 1991.
- Kärrsångare.** Sporadisk gäst.
- Härmsångare.** Sällsynt men troligen nästan årlig häckfågel i ängsbjörkskog.
- Ärtsångare.** Nästan årlig men fåtalig besökare. Troligen sporadiskt häckfågel, men inga säkra indikationer.
- Törnsångare.** Sporadisk besökare.
- Trädgårdssångare.** Sparsam häckfågel främst i ängsbjörkskog. Tätheten har varierat från några få till högst ca 10 par/kvkm.
- Svarthätta.** Sällsynt, ej årlig häckfågel i björkskogsregionen.
- Lundsångare.** Hörd vid enstaka tillfällen, ett år så många som tre olika hanar.
- Nordsångare.** Hörs nästan årligen i björkskog och övre delen av barrskogen, vissa år flera individer. Sannolik häckfågel vissa år.
- Grönsångare.** Sällsynt, nästan årlig besökare. Har häckat.

- Gransångare.** Årlig men sällsynt häckfågel.
- Lövsångare.** Den allmännaste fågelarten i området. I björkskogen kan tätheterna nå upp till 150 par per kvadratkilometer. I barrskogen är tätheten betydligt lägre, sällan över 20 par/kvkm. På fjällheden varierar arten mycket kraftigt, från nästan frånvarande till maximalt 20 par per kvadratkilometer i videregionen.
- Kungsfågel.** Sällsynt till tämligen allmän häckfågel i barrskogen. Starkt varierande antal beroende på överlevnaden under vintern. Tätheter från nära noll till över 30 par/kvkm har noterats, oftast har den varit drygt 10 par/kvkm.
- Grå flugsnappare.** Sparsam häckfågel på alla nivåer upp till trädgränsen. I såväl björk- som barrskog finns blott några få par/kvkm.
- Svartvit flugsnappare.** Allmän till sällsynt häckfågel på alla nivåer upp till trädgränsen. Tätheterna bestäms helt av tillgången på boplatser. Häckar normalt inte i den övre, smalstammiga hedbjörkskogen, men efter uppsättning av holkar kan tätheten bli ca 60 par per kvkm, och i den rikare ängsbjörkskogen kan tätheten ökas från normalt 10-30 par/kvkm utan holkar till över 300 par med holkar. Under en lång följd av år har arten minskat i antal i Ammarnäs.
- Stjærtmes.** Har noterats under sträck- och vintertid, men det finns inga indikationer på häckning.
- Talltita.** Sparsam till tämligen allmän häckfågel i både barr- och björkskog. Tätheten i såväl björk- som barrskog ligger runt 5 par/kvkm.
- Lappmes.** Tämligen allmän häckfågel i barrskogen och sparsam häckfågel i björkskogen. Tätheten i barrskog ligger liksom för talltitan kring 5 par/kvkm. Till skillnad från talltitan häckar lappmesen gärna i holk, medan talltitan vill hacka ut sitt eget bo i en murken stubbe.
- Tofsmes.** Endast några enstaka observationer föreligger. Häckning veterligen ej fastställd. Har registrerats tillfälligt även i björkskogen.
- Svartmes.** Sällsynt och troligen ej årlig häckfågel i barrskogen. Iakttas vid enstaka tillfällen även i björkskogen.
- Blåmes.** Nykomling i Ammarnäs, enstaka par i byn på senare år. Övervintrar i området tack vare matning på fågelborden.
- Talgoxe.** Vanlig häckfågel nära bebyggelse, i övrigt sparsam i barr- och björkskog på alla nivåer. Sprider sig vida sommartid, koncentrerad till byn vintertid, många är förmodligen också flyttfåglar.
- Nötväcka.** Så vitt bekant har endast den sibiriska rasen noterats och bara enstaka år. Har förmodligen inte häckat utan det har enbart rört sig om övervintrande fåglar.

- Trädkrypare.** Sällsynt häckfågel i både barr- och björkskog, i björkskogen dock bara i den rikare ängsbjörkskogen.
- Törnskata.** Sällsynt besökare. Har häckat vid ett tillfälle.
- Varfågel.** Sparsam häckfågel i både barr- och björkregionen, gärna i anslutning till myrar.
- Nötskrika.** Enstaka par häckar möjligen i barrskogen, men ses främst under höstflyttningen och i starkt varierande antal.
- Lavskrika.** Tämligen allmän till sparsam häckfågel i barrskogen. Iakttas även i björkskogen och sällsynt på fjällheden.
- Skata.** Flera par häckar i anslutning till bebyggelse. Kan även häcka vid isolerade gårdar; har således häckat vid Rödingvik.
- Nötkråka.** Tillfälligt noterad i samband med invasioner, senast hösten 1995. Enbart den sibiriska rasen har identifierats.
- Kaja.** Sporadisk gäst.
- Råka.** Sporadisk gäst.
- Kråka.** Tämligen allmän häckfågel i skog. Viktig art som bobyggare åt rovfåglar och ugglor som inte själva bygger bon.
- Korp.** Glest förekommande häckfågel, från skogslandet upp på fjällheden. Större ansamlingar kan iakttas i anslutning till renslakterierna.
- Stare.** Förr vanligare, numera sällsynt, dock nästan årlig häckfågel i byn. Har även häckat i Rödingvik.
- Gråsparv.** Häckfågel vid bebyggelse, särskilt i byns centrala delar.
- Pilfink.** Sporadisk gäst.
- Bofink.** Sparsam häckfågel i både barrskog och rikare delar av björkskogen. Tätheten brukar sällan överstiga 2-5 par/kvkm.
- Bergfink.** Näst lövsångaren den vanligaste arten i björkskogarna och den vanligaste arten i barrskogen. I björkskogen varierar tätheten mellan 30 och över 100 par per kvadratkilometer. I barrskogen är variationerna än större, från blott några få par till ca 100 par per kvadratkilometer. Variationerna har åtminstone delvis kunnat knytas till förekomsten av fjällbjörkmätarlarver.
- Grönfink.** En nykomling under senare år. Flera par häckar numera i Ammarnäs by. Har iakttagits även vid Tjulträsk och Höbäcken. Liksom för blåmesen kan vintermatningen ha haft betydelse för etableringen. Båda arterna har för övrigt expanderat kraftigt i norra Skandinavien under flera decennier. Övervintrar.
- Grönsiska.** Häckar i starkt varierande antal, särskilt i barrskogen. I barrskogen har variationen varit från nära noll till ca 15 par/kvkm.
- Vinterhämling.** Tillfälligt observerad vår och höst.

- Gråsiska.** Vissa år allmän, andra år sparsam häckfågel. Förekommer främst i björkskogen, men även i barrskogen och på fjällheden. Talrikheten styrs delvis av björkens frösättning. Variationen i björkskogen är stor, från blott 2 till nästan 100 par/kvkm, i barrskogen från noll många år till något över 10 par/kvkm.
- Snösiska.** Häckar sparsamt i varierande antal i björkskog och videregion.
- Bändelkorsnäbb.** Troligen häckfågel i barrskogen enstaka år. Sommartid hörs den då och då under särskilda invasionsår, ofta överflygande tillsammans med flockar av mindre korsnäbb.
- Mindre korsnäbb.** Häckar i starkt varierande antal, en del år sannolikt inte alls. Under invasionsår ses den allmänt i området sommartid då flockar både födosöker och sträcker över.
- Större korsnäbb.** Observeras nästan årligen och häckar troligen vissa år.
- Rosenfink.** Enstaka hanar hörs sjunga under våren och sommaren. Ingen häckning registrerad, men att somliga individer kan stanna över sommaren visar ett fynd vid Tjulträsk den 8 augusti 1984.
- Tallbit.** Häckar regelbundet men glest, främst i barrskogsregionen. Utanför själva häckningstiden observeras arten även i björkskogen upp till trädgränsen, i undantagsfall även på fjällheden.
- Domherre.** Sällsynt häckfågel i björkskogen, sparsam i barrskogen. I barrskogen är tätheten 3-5 par/kvkm.
- Stenkäcka.** Har observerats och möjligen häckat vid något tillfälle.
- Lappsparv.** Allmän häckfågel ovan trädgränsen. De högsta tätheterna nås i myrområden, upp till ca 30 par per kvkm. Blir successivt ovanligare mot högre höjder.
- Snösparv.** Tämmligen allmän häckfågel på högre nivåer ovan videbältet, särskilt där det finns stenskravel att dölja bona i.
- Gulsparr.** Enstaka par finns längs vägar och vid bebyggelse. Den har blivit allt sällsyntare från sextioalet, kanske på grund av minskat bete, slåtter och djurhållning. Observeras tillfälligt upp till skogsgränsen.
- Ortolansparv.** Under sextioalet fanns ett fåtal par inom kreatursbetade områden längs vägarna. Med upphörande bete försvann arten och är numera utgången.
- Videsparv.** Sällsynt men troligen årlig häckfågel. Från Tjulträsk föreligger 2-9 observationer per år under sensommaren och arten har fångats nästan varje år under samma tid, vid flera tillfällen ungfåglar. Dock föreligger bara ett fåtal bofynd.
- Dvärgsparv.** Enstaka hanar besöker området kortare perioder på våren. Har häckat vid något enstaka tillfälle.
- Sävsparr.** Allmän häckfågel inom hela skogsregionen, särskilt längs fukti-

gare stråk och myrkanter. Häckar glest även i videregionen. Mest allmän i de tätare videbältena i deltaområdet. Tätheten i rik björkskog håller sig kring 20 par/kvkm.